ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Remarque sur limperforation
de lanus

Par M. Haquet, chirurgien et accoucheur, au service de S. M. limperatrice
Reine apostolique à Idria en carniole

Le quinze de fevrier 1763 je fut mandé chez une Egibrienne qui etoit accou
chez dun garçon bien fait dailleurs, qui manquoit dimperforation au perine,
apres avoir visité lenfant, je preparat aussitot lappareil convenable pour
fair mon operation, je la fit methodiquement mais sen fruit, je visitat la
plai ci bien avec mon doigt, qu'avec un instrument appropriez, pour voir si
je ne pourroit decouvrir lintestin rectum, mais il me fut impossible. Je
fit encore quelques tantative sen beaucoups tourmenter lEnfant, et puis je
pensa ma plai methodiquement. Je reflectit dans le même moment, comment je
pourroit fair pour donner assistence, ne voulant point me retirer sen fruit, assure
que javois promit a la Merre de lEnfant, avant de fair lOperation, de donner assistance a
son Enfant, car ce ne fû que sur cette condition qu'elle i laissa mettre la main, cause des
prejugé de sa Religion qui renferme si bien des caprices que tous les Auteurs.
Apres bien des reflexions, je minvanta un autre moien pour sauver la vi a lenfant, je
proposa aussitot un second secour de lart a la Merre pour son Enfant, mais elle protesta
contre, qu'elle aimai mieux de voir mourrir son Enfant que de le laissait toucher davan
tage. non=abstant cela je visitat le ventre de lenfant, (qui etai encor flasque,) pour
voir si je pourrai fait ma seconde Operation ou non et en efait si javais eû la
permission je laurai pû faire très aissement car je senti dabort lintestain colon qui
etoit remplit de meconium. apres mes dernierres intercessions je quitta mon malade
sen pouvoir fair ma seconde Operation que javai envie de fair.
Trois jours apres mon Operation, jai cherchez la même Egibrienne qui avez changé de plau
dans le bois ou elle habitoit je trouva mon Enfant avec un ventre tendu Convulsions
et vomissements de mathieres stercorales par la bouche. Il est inutil de donner un detaile plus
ample de ce qui cest passez du coté de lEnfant, si bien que de lOperation que jai faite, car
je nai fait qui ce que lart prescrit en pareil cas.
Tous les Auteurs conviennent que quant on ne peut point attaindre lintestin Rectum,
par la voute naturel, quil est impossible de donner assistence autrement. Mais comme
il ne laisse pas bien de donner des preceptz general, aussi est ce tant plus mal, quant on
adopte les sentiments dautruis pour loix fondamental et i etre même esclave, sen
chercher a semploier les siennes.
Quant on est eclairez assez par lAnathomie, et quon sache bien la voute de lint
testain colon on ne doit pas hesiter en pareil cas de fair un anus artificiel, qui
nest pas chose si rarre à ses Armée de voir de telles plaiez rester avec cette
incomodité, et cependant survivre bien des annes. Jai eu loccasion deux foit
davoir de telles plaisses entre mes mains, un lannée 1759 à larmée Russienne
apres la battaile de francfort sur lOdre et un lannée 1760 à larmée Authrichienne
apres la battaile de Torgau, sur lElbe qui par negligence de pensement si bien que
par la mauvaire situation que les plaisses avoint prit, a fait que la gangrene si
est mi et a été la cause de la deperdition de toute la Circonferance de lintertain,
dont je fû obligé de cicatriser la portion superieur a la plai.
Lanus que je propose de fair artificielement dans le cas de defaut, dune portion
dintestain Rectum, ce fait de la façon suivante.
Premierement on visit le bas=ventre de lEnfant du coté gauche, a la Region lom=
baire et audessus los des ils (il faut pour ca que le ventre soit encor flasque car si on
attent plusieur jour le ventre deviendrat tendue et tout la visit quon ferat serat
inutil) dans cette environt on decouvrirat lare du colon ou une portion de son
S. remplit de meconium, surtout si on prend la precausion si dessus prescrit. quant
je dit que lon decouvrirat un portion de lare ou de son S. cest que ca est très
variable, car quelquefois l'S va jusquà la Region lombair gauche comme il a été
obrevé assez par les anathomistes. aussitot que lon laurat assujeti une port
ion de lintestain entre les Doigs, on se ferat une marque a cette endroit aux
tegumens pour i fair louverture, qui doit etre faite cruciaLement, aussitot que
lon aurat penetré dans la cavité du bas=ventre (je ne decrit point le bien exacte)

ARC 56 n° 38

ou il faut faire louverture, parceque ca depend de la Situation de lintestain Colon, comme jai fait mention plus haut) Ensuit on resit le Colon entre les Doigs de la main gauche, pour le amener contre louvertur faite aux teguments. ensuit on passe un Aiguille Courbe enfillé dun fille a plusieurs douple, autour de la circonferance de lintestain, en percean le mésocolon de cette façon le fille forme un anse qui vous asujeti lintestin contre la plai (par le moien des Emplatres aglutinative, que vous assujitiré au fil) pendant la cure. alors vous faite un ouverture a lintestin qui naille pas plus que de la moitié de son Diamétre de cette façon il ne ce ferat point depenchement des matier Stercorales dans la Cavité du bas ventre Apres quoi est sur quils ni a plus de meconium dans la partie inferieur de lintestin, on incise lintestin tout entier, d'on cicatrice la partie superieur a la circonferance interne de la plai

Il y a plein du pour et contre mais plus pour le premier que pour le Second. si l'Enfant peut souffrir l'Operation par le Chemin naturel il peut le souffrir égalment a lendroit que j'indique et si lanus Artificiel peut avoir lieu a un homme adulte, de même peut il avoir lieu chez un Enfant dont les Connoisances de son mal ne lui fait point les impression quil ocasionne a un homme. Je ne cherche point a defendre mille hipotheses que lon pourrait mobjecter car tout ca ne meritte point de place ici, on mobjecterat tout ce quon voudrat, je ne heziterez jamais en pareil ca quant il est impossible dailleurs den venir about, par la route naturel de ne pas fair l'Operation ci dessu proposé. On pourai bien simaginer, que je ne me suis pas bien prit pour fair louvertur Ordinair, mais comme ce ne fu point la premier foit que de pareil Operation mez venu entre les mains daucune ne ma manquez ou lintestin Rectum me manquat que peut de chose, je nest dont pas eu lieu de douter de celle ci, si bien que dautres qui en pauront douter. mais non obstan cela je nest pas manquez dans fair une recherche scrupuleuse, comme on va voir limpossibilité par la description suivant. quatre jours aprez ma premier Operation que javai faite a l'Enfant, ou apres sa naissance, je lai trouvez mort des Convulsion quil avez eu, je dilatat premierement louverture que javai faite pour voir si je mi avez bien prit ou non mais naperçevant point dintestin je fit ensuit louverture du baz ventre pour decouvrir la marche du Colon, qui suivant sa voutte naturele jusqua le dernier vertebre des lombes la il finirai san sinserer a dautres intestin. Ainsi on voit bien limpossibilité du recourt de lart par la voutte naturel. je ne veut point passer pour le premier qui ait fait cette decouvert / aligar de lintestin Rectum qui manquat tout a fait, ni pour celui veulle mettre un nouvelle Operation, au contrair, il serai a souhaiter quon puisse reformer bien des autres, qui son plus cruel que celle cy.